



Amblyseius andersoni

Användning: detta rovkvalster äter många olika kvalster; *Tetranychus urticae*-växthusspinnkvalster, *Panonychus ulmi*-*Aculus schlechtendali*, *Eriophyes canestrinii*, **lever även** av trips, pollen, honungsdagg och svampar.

Biologi allmänt:: naturligt förekommande i Sverige. Aktiv ner till 6-8°C. Tripsrovkvalstret är trots namnet ett polyfagt kvalster. D.v.s. den kan äta och överleva på flera olika skadedjur som: trips spinnkvalster och toppskottskvalster etc. Dessutom är tillgång på pollen en fördel..

Utseende: ett rödaktigt kvalster, 2 långa strån fästa på var sida om bakkroppen.

Användning praktiskt:

Förebyggande vid låga temperaturer (6-8). Eftersom *A. andersoni* är ett polyfagt kvalster och finner lätt alternativa födokällor för att överleva jämfört med kvalster som har ett specifikt värdjur. Tripsrovkvalstret bör som huvudregel användas förebyggande.

Produktbeskrivning:

Tripsrovkvalstren levereras i 1 liters ”rör” med 10.000 i en blandning av kli och vermiculit.

Dos: 20-100 st/m² beroende på skadedjur och kultur.

Påsar: kan även levereras i påsar innehållande minst 250 *A. andersoni*. 1-2 påsar/ löpmeter som vid behov kan förnyas var 6:e vecka.

NOT!: Lämpligt att introducera *Phytoseiulus p.* vid lämplig temp o. vid förekomst av växthusspinnkvalster.

Utsättning:

Utsättning bör ske så snart som möjligt vid leverans. I nödfall förvaring kortare tid vid 13-14 °C. **Prydnadsväxt:** Obs! påsarna skall vidröra bladverket för optimal spridning. Undvik jordkontakt.

Andra kompletterande produkter:

Phytoseiulus p. växthusspinnkvalster

Amblyseius californicus:

Kontaktverkande medel som:

Bioglans (parafinolja)