



## Binab® TF WP

**Ett slampulver för besprutning, utvattning och inblandning i substrat mot svampsjukdomar**

### Aktivitet

Produktens aktivitet kommer från *Trichoderma (polysporum) parasiluliferum* och *Trichoderma (harzianum) atroviride* med en koncentration av log<sub>7</sub> CFU (kolonibildande enheter) per gram, aktiviteten garanteras i två år vid förvaring i frys.

### Användning

Binab TF WP kan användas mot svampangrepp på frukt-, prydnads-, skogsträd, bärväxter, prydnadsväxter, gräsytor, grönsaker och buskar.

### Karenstid

Det är ingen karenstid på ätliga grödor.

### Varningstext

Undvik kontakt med ögon och hud  
Tvätta händer med tvål och vatten  
Förvaras oåtkomligt för barn  
Förvaras torrt, svalt och ej i direkt solljus

### Verkningsätt

När Binab TF WP tillsatts plantorna blir *Trichoderma* kolonierna aktiva med hjälp av ett "matpaket" som tillsatts produkten och säkerställer att svamparna börjar gro, *Trichoderma* svamparna attackerar befintliga skadesvampar och/eller fortsätter att växa både på växten ovan jord och i rotsystem där de söker sin föda. Denna livsform bar funnits under lång tid utan att resistens mot *Trichoderma* har utvecklats. *Trichoderma* sp. överlever utan att det finns skadesvampar att angripa. Binab TF WP bör därför användas i förebyggande syfte, både *Trichoderma (polysporum) parasiluliferum* och *Trichoderma (harzianum) atroviride* är mycket aktiva "rosvampar" som angriper en rad olika skadesvampar t.ex. *Botrytis (gråmögel)*, *Fusarium*, *Häxringar* *Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*, *Verticillium* och andra skadesvampar som växer i jord samt *Didymella*, *Heterobasidion* och *Chondrostereum*. Binab TF WP är verksam från 2°C-32°C, Vid övriga temperaturer avstannar all aktivitet.

### Produkten

Binab TF WP levereras som ett slampulver, i jord bryts Binab TF WP ner av bakterier efter en tid, Kom ihåg att Binab TF WP innehåller levande organismer som i vissa fall påverkas av kemiska pesticider\*, Därför bör all besprutningsutrustning noggrant rengöras innan den används, (Dessutom är det att rekommendera ett behandlingsintervall på 3 - 7 dagar till andra bekämpningsmedel i de behandlade kulturerna).

Notera att effekten av Binab TF WP kan variera i olika kulturer och blandningar beroende på bl. a. sjukdomstrycket. Gör därför alltid en testbehandling på ett mindre område innan Binab TF WP används på hela odlingen.