

BladKalcium



BladCalcium 100 % naturlig kalkspat bestående av:

Calciumkarbonat 79%, magnesiumkarbonat 4,6%, kisel 3,8% och spårämnen som järn, koppar, mangan, selen och zink.

Verkan

BladCalcium® består av mikroskopiska kalkpartiklar med en storlek på under 10 µm.

Det är tillverkat med en unik patenterad process där kalkpartiklar "kolliderar" under hög fart. De ultrafina kalkpartiklarna i BladCalcium® kan, till skillnad mot vanlig kalk, tränga in i bladet och relativt snabbt uppnå önskad effekt. Tillväxt, avkastning, kvalitet och därmed ökad motståndskraft efter behandling med BladCalcium®.

Användning

BladCalcium® löses upp i vatten och sprutas både på ovan- och undersidan av bladen och i vissa tillfällen direkt på frukt. Sprutningen skall ske tidigt på morgonen eller på kvällen - aldrig i klart solsken. Starta behandlingen tidigt i plantans utveckling. Med tillsättande av vätnedel kan effekten ökas och fällning undvikas. Allt efter planttyp används mellan 0,5 – 3 kg/ha.

BladCalcium® är lämpligt att användas i många olika kulturer, både inom jordbruk och trädgårdsodling, men provspruta alltid. Speciell försiktighet skall iakttagas vid surväxter - och känsliga plantor. BladCalcium är ej farligt för människor, djur och miljön, om instruktionerna om användning följs.

BladCalcium® får användas till ekologisk odling enl. danska regler.

Vägledning vid tillredning av sprutvätska: Fyll tanken med 2/3 till 3/4 av den önskade vattenmängden. Börja omrörningen och tillsätt Calcium®. Fyll på den resterande mängden vatten under omrörning. Omrörning rekommenderas under utvattningen. (BladCalcium kan blandas med de flesta pesticider, men undvik stark syra och produkter med fosfor, då detta kan orsaka fällning till calciumfosfat. Fläckning kan förekomma om vattnet har för högt pH-värde. Provspruta därför alltid! Tendens till fläckar kan motverkas med tillsats av vätnedel. Utsprutning av BladCalcium® bör ske direkt efter tillblandning.

Dosering

Exempelvis för sallad

Not! Den nödvändiga vätskemängden/ha beror på spruttyp m.m. För god täckning rekommenderas en dosering av ca 0,2% (200gr i 100 litervatten/1000 m²)

Sallad: när salladsplantan blivit ca 3cm i rosetten 1.a sprutning därefter sprutning varje vecka.

Grönsaker: 0,5-2 kg/ha (3-4 behandlingar); i början eller efter fullt utvecklade karaktärsblad och därefter ca var 14:e dag.

Kärn- och Stenfrukt: 1-3 kg/ha (3-4 behandlingar); start med de första bladen, därefter var 14:e dag – 4:de vecka.

Prydnadsväxter: 0,5-3 kg/ha; med start på våren och därefter var 2-3:dje vecka eller när förhållandena kräver det. I växthus kan behandling ske under hela året. I växthus, men max varannan vecka.

Raps och Majs: 1 kg/ha (1 behandling); vid bildandet av 4-6 blad.

Ärtfamiljen: 1-2 kg/ha (2-3 behandlingar); med början vid bildandet av 4-6 blad och därefter var 3:e vecka.

Potatis: 1,5-2 kg/ha (2-3 behandlingar); med början vid bildandet av 4-6:e bladet därefter var 3:e vecka.

Gräs: 3-5 kg/ha; användning 2-3 dagar efter klipp, f.o.m. vår till höst- behandling vid behov.