

AZATIN® EC



2,7 % Azadirachtin (w/w)

INSECTICID

Insekticid för användning mot insektsangrepp i växthusodling av prydnadsväxter, jordgubbar, tomat, gurka, aubergine, zucchini, melon, vattenmelon, pumpa, spenat, escarole, endiver, sallat, rucicola, betblad, persilja och basilika.

Azatin har en systematisk verkan, även genom rotabsorption, och verkar genom direkt kontakt eller förtäring.

VERKNINGSSÄTT

Azatin EC är en naturlig insekticid vars huvudingrediens härrör från frön av den tropiska växten Azadirachta indica (neemträd).

Azatin EC verkar genom direkt kontakt eller genom förtäring och har även avskräckande effekt. Insekter som träffas eller som suger och äter av behandlade blad, slutar att inta föda, varefter deras utveckling från ägg-, larv- eller puppstadiet hämmas genom, att Azadiraktin motverkar bildandet av det hormon som främst ansvarar för kontroll av hudömsning. Beroende på skadedjurets utvecklingsstad kan det därför ta 1-6 veckor innan full effekt uppnås. Azatin EC verkar lokalsystemiskt i växten, samt även genom rotabsorption, då det kan transporteras upp till plantans övre delar.

Azatin EC kan ha negativa effekter på biologisk bekämpning med nyttosekter.

BRUKSANVISNING

Azatin EC ska appliceras på blad.

Mot bakgrund av produktens verkningsätt ska Azatin EC användas i förebyggande syfte eller första gången angrepp av skadeinsekter uppträder. Applicera produkten i svala villkor och dämpade ljusförhållanden. Se till att växten täcks helt av produkten. Behandlingen måste upprepas efter 7-10 dagar, vilket motsvarar insekternas biologiska cykel.

DOSERING:

Prydnadsväxter (växthus) mot insektsangrepp:

1,0-1,5 l/ha för 800-1000 l/ha vatten. Produkten ska användas högst 5 gånger per kulturomgång.

Tomater, auberginer (växthus) mot insektsangrepp:

1,0-1,5 l/ha för 1000 l/ha vatten. Produkten ska användas högst 5 gånger per kulturomgång.

Gurka, squash, meloner, vattenmelon, pumpor (växthus) mot insektsangrepp:

1,0-1,5 l/ha för 1000 l/ha vatten. Produkten ska användas högst 5 gånger per kulturomgång.

Jordgubbar (växthus) mot insektsangrepp:

1,0-1,5 l/ha för 800-1000 l/ha vatten. Produkten ska användas högst 4 gånger per år.

Sallat, persilja, basilika, rucicola, spenat, escarole, endiver, betblad (växthus) mot insektsangrepp:

1,0-1,5 l/ha för 600-800 l/ha vatten. Produkten ska användas högst 3 gånger per kulturomgång.

Tillredning av sprutväska

Fyll halva tanken med vatten. Starta omröraren och tillsätt föreskriven mängd Azatin EC.

Fyll tanken ända upp och se till att omröraren fortsätter att arbeta kontinuerligt.

Blandningen måste röras om konstant under hela behandlingen.

När produkten applicerats ska du rengöra utrustningen och spruta sköjväska på det behandlade området.

FÖRVARING

Förvara inte produkten i temperaturer över 54 °C. Produkten förblir stabil i ett år i rumstemperatur.

TANKBLANDNING

Varning: Om produkten blandas med andra produkter ska den längsta väntetiden beaktas.

Dessutom måste de försiktighetsåtgärder som gäller för de giftigaste ämnena följas.

Vid förgiftning måste läkare informeras om alla produkter i blandningen.

KARENSTID

7 dagar för jordgubbar och bladgrönsaker, 3 dagar för fruktgrönsaker, 0 dagar för prydnadsväxter.

YTTERLIGARE INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING

Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutväska eller sprutidmån.

Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.

Vid återinträde i det behandlade utrymmet efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas. Återinträde får ske utan skyddsutrustning efter 48 timmar.

Förörens inte vatten med produkten eller dess behållare.

Rengör inte material som använts för applicering nära ytvatten.

Undvik förorening genom avloppsnätet för jordbruk och vägar.

INFORMATION TILL LÄKARE

Behandling: symptomatisk, framkalla inte kräkning vid sväljning.

Varning: kontakta giftinformationscentralen.

VARNING:

Produkten ska användas endast för de ändamål och under de villkor som anges på denna etikett.

Produktens användare ansvarar för skador som uppstår till följd av missbruk. För att behandlingens effektivitet ska kunna säkerställas och för att undvika skador på växter, människor och djur är viktigt att man följer alla instruktioner på denna etikett. Får inte appliceras genom flygsprutning.

Får inte appliceras i stark vind.

Azatin® EC

Emulgerbart koncentrat (EC)

Aktivt ämne:

Azadiraktin A: 26 g/l

Registreringsnummer: 5505

Behörighetsklass: 2 L

Endast för yrkesmässigt bruk

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH401 - För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

P280 - Använd ögonskydd/ansiktsskydd.

P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN:

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P501 - Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

SP1 Förorens inte vatten med produkten eller dess behållare.

Innehavare av godkännandet:

Mitsui AgriScience International S.A./N.V.

Avenue de Tervueren 270- B-1150 Bryssel - Belgien

Tfn 0032-2-7619440

Satsnr. och utgångsdatum: Se behållaren

Innehåll: 1 liter



Varning

423140

Innehavare av godkännandet:
Mitsui AgriScience International S.A./B.V.
Av. de Tervueren, 270
1150 Bruxelles

Distributör:
Biobasiq Sverige AB
Braxengränd 3
312 33 Laholm

Information:
info@biobasiq.se
www.biobasiq.se

1L

